

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Pomme de Terre

Bulletin Technique n°11 du 24 juin 2008 - 2 pages

Mildiou

Les pommes de terre les plus avancées sont en pleine floraison, tandis que les autres sont au stade boutons floraux et débuteront leur floraison cette semaine.

L'espacement des épisodes pluvieux diminue légèrement le risque mildiou, mais la présence des symptômes dans certaines parcelles ou sur tas de déchets nécessitent de rester vigilant.
Maintenez la protection fongicide sur toutes vos parcelles.

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station météo SRPV – Fredon – données au 23/06				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 17/06
77-Chevry Cossigny	7ème	Du 20 au 22/06	26/06	8,5
77-Villeroy	7ème	20/06	27/06	7
78-Boissy Sans Avoir	6ème	19 et 20/06	24/06	2,5
78-Poissy	7ème	20/06	26/06	3,5
91-Abbeville la Rivière	8ème	20 et 21/06	26/06	7,5
95-Villiers le Sec	8ème	20/06	27/06	12
Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station Météo France – données au 21/06				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 15/06
77-Changis sur Marne	6ème	20/06	27/06	5,2
77-La Brosse Montceaux	7ème	20/06	27/06	6,2
77-Nangis	7ème	20/06	27/06	10,2
77-Nemours	6ème	20/06	28/06	7,6
91-Bretigny	6ème	16 et 20/06	23/06	9,2
91-Courdimanche	5ème	20/06	27/06	6,4
91-Villiers le Bâcle	6ème	20/06	23/06	18
78-Magnanville	5ème	20 et 21/06	27/06	16
95-Roissy	Aucune contamination			13,8
95-Cormeilles en Vexin	Aucune contamination			6,4
95-Wy dit Joli Village	Aucune contamination			6,4

Ravageurs

Pucerons

Les populations de pucerons progressent par rapport à la semaine dernière, et se rapprochent ou dépasse le seuil pour le déclenchement du traitement insecticide (50% folioles porteuses - voir méthode de notation dans le bulletin n°9).

Si vous effectuez un traitement, un volume d'eau de 400L/Ha est recommandé car les pucerons se situent sous la face inférieure des feuilles et sont donc plus difficiles à toucher. De plus, l'intervention doit être réalisée après l'irrigation pour éviter le lessivage.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : N. THERRE



	% de folioles porteuses
77-Aufferville	0%
77-Chambry	23%
77-Iverny	58%
77-Jouy le Châtel	0%
77-Nangis	0%
77-Villenauxe la petite	60%
91-Méréville	40%
91-Milly la Forêt	30%
95-Auvers sur Oise	5%

Efficacité des Aphicides sur les pucerons de la pomme de terre

Spécialités commerciales		**Matière active**	**"Pucerons courants"**	
Nom	**Dose/Ha**	**Composition**	***Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum***	***Aphis nasturtii***
BROXER*	0,5 L	Esfenvalérate Fenitrothion	++	+
GEOTION TX	1,5 L	Cyperméthrine Chlorpyriphos-éthyl	++	+++
PIRIMOR G	0,5 Kg	Pyrimicarbe	+++	0
KARATE K OPEN	1,25 L	Lambda-cyhalothrine Pyrimicarbe	+++	++
BEST = STATUS	1,25 L	Deltaméthrine Pyrimicarbe	+++	++
SUMI ALPHA	0,5 L	Esfenvalérate	+(+)	++(+)
KARATE XPRESS	0,25 Kg	Lambda-cyhalothrine	+(+)	++(+)
KARATE Technologie Zéon	0,125 l/ha	Lambda-cyhalothrine	+(+)	++(+)
TEPEKI	0.14	Flonicamid	+++	+++
PLENUM 50Wg	0,3 Kg	Pymétrozine	+++	+++

Légende :
+++ Très efficace
++ Efficace
+ Insuffisant
0 inefficace

BROXER - BEST - STATUS = dernière année d'utilisation

Doryphores

Pas de doryphores observés.